

平成23年4月8日

地域医療機関の先生方へ

三田市民病院
地域医療連携室長（副院長）
木西 實

造影検査御紹介時の服薬指導について（お願い）

春暖の候、先生方におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は当院の運営とりわけ地域連携に格別のご指導とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、造影 CT 検査及び尿路造影検査で使用するヨード系造影剤とビッグアライド系糖尿病治療薬の併用により乳酸アシドーシスを起こすことがあり、当院で検査を受けられる患者様にその治療薬の服用を一時的に中止していただく必要があります。

つきましては、当造影検査御紹介時は、下記の通り服薬制限について患者様にご指導、ご説明くださいますようお願い申し上げます。

記

1 **造影検査前、2日間および造影検査当日**は、ビッグアライド系糖尿病治療薬（別紙ご参照）の服用中止をお願い致します。

なお、同薬の服用中止ができなかった場合、造影検査を中止させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。ただし、緊急の検査を必要とする場合は、除外します。

2 **造影検査終了後、2日間**もビッグアライド系糖尿病治療薬の服用を再開しないよう、お願い致します。また、造影検査終了後、患者様の腎機能回復に不安がある場合は、先生のご判断で再開時期をさらに延期するなどのご検討をお願い致します。

3 当造影検査予約の依頼の依頼をされる際、診察・検査予約申込書（FAX用）の連絡事項欄に「患者へのビッグアライド系糖尿病治療薬の服用中止説明済み」という文言を記載のうえ FAX にて御予約依頼くださいますようお願い致します。

何かご不明な点がございましたら、地域連携センターまでお問い合わせください。
御理解と御協力ならびに今後ともご利用くださいますようお願い致します。

地域連携センター

電話：079-565-8607（地域連携センター直通ダイヤル）

FAX：079-565-8015（予約申込用 FAX 番号）

下の写真の“糖尿病薬”を飲まれている方は 造影CT検査や尿路造影検査を受ける前に 放射線科スタッフにお知らせください



メタクト配合錠LD



メタクト配合錠HD



メトグルコ錠250mg



グリコラン錠250mg



メデット錠250mg



メルビン錠250mg



ネルビス錠250mg




メトホルミン塩酸塩錠250mg「トーフ」



メトリオン錠250



ジベツ錠50mg



ジベトンS腸溶錠50mg

日本医学放射線学会・
日本放射線科専門医会・医会
合同造影剤安全性委員会

2010年10月